



เหมือดโลด

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aporosa villosa* (Wall. ex Lindl.) Baill.

ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง กรม (ภาคใต้) ต่าง แต่งพง (สุโขทัย) ตีนครีน พลัง โลด (ภาคกลาง) ประดงข้อ (พิจิตร) เหมือดควาย เหมือดตบ (ภาคเหนือ) เหมือดหลวง (เชียงใหม่)

ลักษณะ เป็นไม้ต้น สูง 6–10 ม. เปลือกหนาแตกเป็นร่องลึก กิ่งอ่อน ใบอ่อนและช่อดอก มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองห่ม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานกว้าง หรือรูปรีแกมรูป

ไข่ กว้าง 6–10 ซม. ยาว 10–16 ซม. ปลายใบมน โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 1.2–1.8 ซม.

ดอก เล็ก สีเหลืองอ่อนๆ แยกเพศ ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบและกิ่ง ช่อดอกเพศเมียสั้นกว่าช่อดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้ มี 2 อัน

ผล รูปไข่ กว้างประมาณ 0.7 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายเป็นติ่ง 2 แฉก เมื่อแก่สีน้ำตาลอมเหลือง มักแตกตามตะเข็บ 1–2 ด้าน เมล็ดมีเยื่อสีเหลืองหุ้ม