


กระถินณรงค์

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Acacia auriculiformis</i> A.Cunn. ex Benth.
ชื่อวงศ์	LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง	กระถินป่าหรือ กระถินแดง



ลักษณะ ของต้นกระถินณรงค์ ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เรือนยอดทรงกลมทึบ กิ่งห้อยย้อย เปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาล เข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ไม้เป็นระเบียบ

ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เมื่อยังเป็นกล้าอยู่และร่วงไปเมื่อโตขึ้น เหลือเพียง ก้านใบแล้วเปลี่ยนรูปเป็นคล้ายแผ่นใบ เรียงสลับถี่และห่างเป็นระยะ ใบรูปขอบขนาน กว้าง 1-6 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายและโคนใบเรียวแหลม โคนเป็นรูปเคียว แผ่นใบหนา สีเขียว

ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงเป็นคู่ๆที่ช่อใบและปลายกิ่ง ยาว 4-10 เซนติเมตร มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก โคนกลีบเลี้ยงติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบ ดอกติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบลง เกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก

ผล ผลแห้งแตก เป็นฝักแบน สีเขียว ม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง เมื่อแก่มีสีน้ำตาล และแตก ออกทั้งสองด้าน เมล็ดสีน้ำตาลดำเป็นมัน 5-12 เมล็ด

สถานภาพ ไม้หวงห้ามธรรมชาติประเภท ก.